












Direzione Generale
Unità di Staff Risk Management e Qualità

Misure di prevenzione da adottare in isolamento domiciliare dopo aver effettuato il tampone.



	Misurarsi la temperatura corporea quotidianamente. Se la temperatura è > 37.5 °C, avvisare il medico che ha richiesto il tampone.
	Se vive con altre persone deve rimanere in stanza dedicata e dotata di buona ventilazione possibilmente servita da bagno dedicato, dormire da solo/a e limitare al massimo i movimenti in altri spazi della casa dove vi siano altre persone.
	In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di almeno un metro e deve essere assolutamente evitato ogni contatto diretto (compresi strette di mano, baci, abbracci).
	Se disponibile un solo bagno, dopo l'uso pulire con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 di cloro attivo oppure con alcol 70%.
	Deve essere evitato il contatto diretto anche con altre persone sottoposte ad isolamento.
	Evitare ogni possibile via di esposizione attraverso oggetti condivisi inclusi (asciugamani, salviette o lenzuola, piatti, bicchieri, posate, ecc). Gli oggetti da cucina andranno lavati con attenzione con normale sapone.
	E' vietato spostarsi da casa.
	Evitare visite da parte dei familiari o amici.
	Il giorno del ricovero recarsi in ospedale con mascherina facciale.